

NIIGATA DENTAL JOURNAL

Volume 39, Number 1 2009

CONTENTS

Special articles

- Autotransplantation of Teeth with Complete Root Formation Chikara Saito, et al. 1

Original articles

- Effect of post type and loading condition on the failure resistance and primary failure mode of flared canal teeth restored with fiber-reinforced or cast posts Farhana Sharmin, et al. 15
- Effect of 6-month administration of Cevimeline hydrochloride on salivary flow rate and salivary components in primary Sjögren's syndrome patients Saori Funayama, et al. 25
- An Evaluation of the New Dental Curriculum for Undergraduates at the Niigata University Faculty of Dentistry Kazuhiro Ono, et al. 29
- Clinico-statistical Study of Oral and Maxillofacial Injuries of Children for the Last Eight Years Yumi Banzai, et al. 41
- A clinico-statistical study of the maxillo-facial fracture during the past 32 years Takahiro Koyama, et al. 49

Current topics

- New treatment strategy for a traumatic injury of trigeminal nerve with PGA-collagen tube Kenji Seo, et al. 55
- New approaches for generating induced pluripotent stem (iPS) cells Yoshihiro Amaya 57
- The Measurement of Oral Diadochokinesis with new measurement device Kayoko Ito 61

Minireview of thesis

- Comparison of the modulatory effects on the jaw-opening reflex among the different periods of mastication in awake rabbits Rahman Md Mostafeezur 65
- Immunocytochemical Localization of Caveolin- 3 in the Synoviocytes of the Rat Temporomandibular Joint During Development Masahiro Niwano 67
- The study of growth changes in the mouthful weights and its coefficient variations Katsushige Kawasaki 69
- Quantitative messenger RNA expression of Toll-like receptors and interferon- α 1 in gingivitis and periodontitis Keiko Kajita 71
- Prospective Study on Prognostic Factors of Autotransplantation of Teeth with Complete Root Formation Toshiko Sugai 73
- Relationship between periodontitis and osteoporosis in Japanese community-dwelling postmenopausal women Osamu Takahashi 75
- Effects of mandibular setback surgery on oropharyngeal airway and respiratory function during sleep Daichi Hasebe 77
- Does the head start to move preceding the mandible during stable jaw open-close movement? Asako Kai 79

- Hard and soft tissue profile changes before and after treatment in severe maxillary protrusion cases : A comparison of surgical orthodontic treatment and orthodontic treatment alone Yasushi Mise 81

Abstracts of Niigata Dental Society

- Announcements 85
- (Rules and Regulations, Instruction to Contributors) 93

BEAUTIBOND



● 1ステップ接着操作(トータル30秒)

● 高い接着力を実現 !

BeautiBond



管理医療機器
医療機器認証番号 219AKBZX00196000

歯科用象牙質接着材

ビューティボンド

¥14,000

内容:ビューティボンド...6mL
松風Vデイツシュ...25枚
マイクロチップファイン(ピンク)
(ハンドル1本、アブリケーターチップ50本)

2009年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)



世界の歯科医療に貢献する
株式会社 松風

・本社:〒605-0983京都市東山区福岡上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

<http://www.shofu.co.jp>



ナゼアは、抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う
悪心・嘔吐を強力に持続的に抑制します。



おだやかな夜、やすらぎの朝。

【効能・効果】抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)
【用法・用量】通常、成人には塩酸ラモセトロンとして0.3mgを1日1回静脈内投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。また、効果不十分な場合には、同用量を追加投与できる。ただし、1日量として0.6mgを超えないこととする。
【使用上の注意】(抜粋)

1.重要な基本的注意 本剤は強い悪心、嘔吐が生じる抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)の投与の場合に限り使用すること。
2.副作用 承認時までの臨床試験では、352例中18例(5.1%)に市販後の使用成績調査及び市販後臨床試験では、3,464例中260例(7.5%)に臨床検査値異常を含む副作用が認められている。(再審査結果通知:2007年6月)
以下の副作用は、上記の試験・調査あるいは自発報告等で認められたものである。
(1)重大な副作用 ショック、アナフィラキシー様症状(頻度不明)、ショック、アナフィラキシー様症状(気分不良、胸内苦悶感、呼吸困難、喘鳴、顔面潮紅、発赤、そう痒感、チアノーゼ、血圧低下等)を起こすことがあるので観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中心し、適切な処置を行うこと。
(2)重大な副作用(類薬) てんかん様発作:他の5-HT₃受容体拮抗型制吐剤で、外国においててんかん様発作があらわれたとの報告がある。

■その他の使用上の注意等につきましては、製品添付文書をご参照ください。

5-HT₃受容体拮抗型制吐剤(塩酸ラモセトロン注射液) 薬価基準収載

ナゼア 注射液0.3mg

癌治療をサポートする
ひとつであつた。

Nasea®

製造販売 アステラス製薬株式会社
東京都板橋区蓮根3-17-1

[資料請求先] 本社/東京都中央区日本橋本町2-3-11

085作成.A412.B.04