

—原著—

口蓋裂言語が長期残存している成人口蓋裂患者の心理的受容過程

深井真澄¹⁾, 大湊麗^{1,2)}, 高木律男^{1,2)}¹⁾新潟大学大学院医歯学総合研究科顎顔面口腔外科学分野 (主任: 高木律男教授)²⁾新潟大学医歯学総合病院歯科言語治療室 (主任: 高木律男教授)

Psychological Process in adult patients with long-term residual cleft palate speech

Masumi Fukai^{1,2)}, Rei Ominato^{1,2)}, and Ritsuo Takagi^{1,2)}¹⁾Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences (Chief: Prof. Ritsuo TAKAGI)²⁾Speech Clinic in Dentistry, Niigata University Medical and Dental Hospital (Chief: Prof. Ritsuo TAKAGI)

平成 29 年 10 月 2 日受付 平成 29 年 11 月 30 日受理

要旨

口蓋裂患者は乳児期から成人期に至るまでの一貫治療により、多くの症例では正常な顎形態ならびに言語機能を獲得している。しかしながら、一般的に、ごく少数では個々の様々な要因により、機能障害を残存する症例があり、成人期以降の治療管理に苦慮する場合がある。今回、口蓋裂言語に着目し、成人口蓋裂患者の心理的受容過程を質的に検討し、患者の視点に立った言語管理のあり方について考察した。なお、口蓋裂患者が自らの言語の特異性の認識から受容に至るまで生成されたカテゴリーは、1) 日常的な通院、2) 言語の特異性の未認識、3) 告知に対するショックと戸惑い、4) いじめ体験や親への反発、5) 言語の特異性の認識と他者との違いへの葛藤、6) 周囲の支えと新たな気付き、7) 言語の特異性の受容、8) 自己への自信、9) 医療者への信頼、10) 言語治療への希望であった。言語管理の一側面として、継続的な心理的サポートの役割が再確認された。

キーワード：口蓋裂言語，心理的過程，質的研究

Abstract

To optimize management, we conducted a qualitative assessment of patients with cleft palate until they reached adulthood to understand their acceptance of long-term residual cleft palate speech characteristics. The speech-specific effects of cleft palate perceived by patients were as follows: 1) need for day-to-day ambulatory therapy, 2) no recognition of the specificity of their speech, 3) shock and confusion relating to the specificity of their speech, 4) experience of bullying and opposition faced by their parents, 5) recognition of the specificity of their speech and conflicts regarding the differences from the speech of others, 6) family support and recognition, 7) acceptance of the specificity of their speech, 8) self-confidence, 9) trust in the care provided by medical professionals, and 10) acceptance of treatment benefits. As an aspect of cleft speech management, the role of ongoing psychological support was reaffirmed.

Key words: cleft palate speech, psychological acceptance process, qualitative research

【緒言】

口蓋裂は先天性の顔面奇形の中で高率に認められる疾患である¹⁾。乳児期から成人期に至るまでの一貫治療により、多くの口蓋裂患者が正常言語を獲得するが、一般

的に、少数では口蓋裂に関連した言語の異常（以下、口蓋裂言語）が長期残存する症例がある。口蓋裂言語は第一印象で相手に好意的な印象を与えにくく²⁾、口蓋裂言語が残存している場合、コミュニケーションは受身的になりやすい³⁾。また、口蓋裂言語が負の要因となり、人格形成に負の影響⁴⁾や、顔面の審美障害なども加わっ