

- 臨床 -

上唇毛包腫の1例

宇都宮 宏子¹, 依田 浩子², 鈴木 一郎³, 朔 敬²

新潟大学歯学部学生¹
 新潟大学歯学部口腔病理学講座²
 (主任: 朔 敬 教授)
 新潟大学歯学部口腔外科学第一講座³
 (主任: 新垣 晋 助教授)

Trichofolliculoma of the upper lip: Report of a case

Hiroko Utsunomiya¹, Hiroko Ida², Ichiro Suzuki³, Takashi Saku²¹Dental student²Department of Pathology (Chief: Prof. Takashi Saku) and³First Department of Oral and Maxillofacial Surgery (Chief: Associate Prof. Susumu Shingaki),
Faculty of Dentistry, Niigata University

平成12年5月8日受付 6月1日受理

Key words : trichofolliculoma (毛包腫), hamartoma (過誤腫), hair follicle (毛包)

Abstract

We report a rare case of a trichofolliculoma of the upper lip in a 48-year-old Japanese man. The tumor, measuring 12 × 11 × 11 mm in size, was located in the dermis to subcutaneous layer around the mucocutaneous border of his upper lip. There was a small fistula-like pit in the skin covering the tumor. The patient had noticed the tumor for 15 years, during which it grew gradually with occasional excretion of white-colored cheese-like substance from the pit. Its clinical diagnosis was atheroma. Histopathologically, it consisted of a nodular proliferation of fibroblasts with fibrous connective tissues, within which there was a cystic space lined by skin with plentiful dermal appendages. This was the second case report of a labial trichofolliculoma from dental institutions.

抄録

左側上唇部に生じた毛包腫の一例を経験した。患者は48歳男性で、15年程前より左側上唇部に小腫瘍が出現し、7年前より腫瘍の増大と圧迫による白色泥状の内容物の排出を繰り返していた。初診時、腫瘍は12 × 11 × 11 mmで半球状を呈し、表面皮膚には瘻孔開口部様を呈する陥凹がみられた。アテロームの臨床診断のもとに腫瘍摘出術がおこなわれた。腫瘍表面には線維性被膜が認められ、周囲組織とは完全に隔てられていた。病理組織学的には、細胞密度の高い線維性結合組織中に多数の毛包、皮脂腺組織の増生が認められ、毛包腫と診断された。毛包腫の発生は類縁疾患の類皮嚢胞と比較して極めて稀であり、本症例は歯科領域からの報告としては第2例目である。

結 言 症 例

毛包腫は毛包分化を主体とする皮膚付属器の過誤腫性病変である。その発生は、類縁疾患の類皮嚢胞に比較して稀であり、とくに口腔領域における報告例はほとんどない。今回われわれは、左側上唇部に生じた毛包腫を経験したので、文献的考察を加えてその概要を報告する。

患者：48歳，男性。
 初診：1999年5月18日。
 主訴：左側上唇部の腫瘍。
 既往歴：十二指腸潰瘍（45歳時）。
 現病歴：15年前に左側上唇部に面皰様の小腫瘍が出現し